SPONGIEUSE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

VÉRIFICATION AVANT LE TRANSPORT:

Avez-vous vu une spongieuse?

Tous les 7 à 10 ans, des pullulations de cet insecte envahissant s'attaquent aux arbres de l'est du Canada, dévorant leurs feuilles et les rendant vulnérables aux maladies, aux autres attaques d'insectes et à la mort.

La spongieuse n'est pas encore établie dans l'ouest du Canada – faisons en sorte qu'il en soit ainsi!

Photo : Karla Salp, Washington State Department of Agriculture, Bugwood.org

OÙ VÉRIFIER

Quelques actions simples peuvent aider à prévenir la propagation de la spongieuse dans l'ouest du Canada et à limiter ses répercussions dans l'est du pays.

Inspectez votre véhicule.

La spongieuse peut se propager en s'accrochant aux voitures, aux remorques, aux caravanes ou aux VTT, ou pondre des œufs sur ceux-ci. Inspectez soigneusement votre véhicule à la recherche d'œufs, de chenilles ou de la spongieuse. Balayer l'intérieur de la remorque ou caravane. Enlevez les plantes, les insectes et la boue.

Vérifiez vos articles et équipements de plein air.

Les spongieuses sont présentes dans les zones rurales et urbaines. Il est donc important d'inspecter tous vos articles de plein air, y compris les grils, les meubles de patio, les jeux de plein air et le matériel de camping.

Ne déplacez pas le bois de chauffage.

La spongieuse se nourrit de plus de 300 espèces d'arbres et pond ses œufs sur ceux-ci. Achetez le bois de chauffage à proximité de l'endroit où vous le brûlerez pour éviter de le transporter. Laissez le bois de chauffage inutilisé sur place.

Canadian Council on Invasive Species
Conseil Canadien des Espèces Envahissantes

SPONGIEUSE

SIGNES À SURVEILLER

Automne/hiver

Les masses d'œufs mesurent de 3 à 6 cm de long et sont recouvertes de poils de couleur foncée provenant de l'abdomen de la femelle.

Photo : Karla Salp, Washington State Department of Agriculture, Bugwood.org

Printemps/début de l'été

Les larves passent par une série de mues. Les stades ultérieurs présentent des tubercules (excroissances) bleus et rouges.

Photo : Steven Katovich, Bugwood.org, Karla Salp, Washington State Department of Agriculture, Bugwood.org

Début ou milieu de l'été

Les larves deviennent des pupes brun rougeâtre pendant 1 à 2 semaines.

Photo : Karla Salp, Washington State Department of Agriculture, Bugwood.org, Pest and Disease Image Library, Bugwood.org

Fin de l'été

Les mâles sont brun marbré et ont une envergure de 3,5 à 4 cm. Contrairement aux femelles, ils sont capables de voler.

Photo : Pest and Disease Image Library, Bugwood.org

Fin de l'été

Les femelles sont blanches avec des marques noires et ont une envergure de 5,5 à -7 cm.

Photo : Pest and Disease Image Library, Bugwood.org

SI VOUS TROUVEZ UNE SPONGIEUSE:

Évitez tout contact direct. Un contact peut provoquer des éruptions cutanées mineures, une irritation des yeux ou des problèmes respiratoires. Évitez tout contact direct en portant des manches longues, des gants et un masque de protection lorsque vous les manipulez.

Tuez-la! Détruisez les masses d'œufs ou les chenilles en les plaçant dans de l'eau chaude savonneuse et en les laissant tremper pendant au moins 2 jours avant de les jeter à la poubelle.

Observez et signalez sa présence. Vous trouverez la marche à suivre pour signaler des espèces envahissantes dans votre province ou territoire sur le site www.signalez-envahissantes.ca.

Références Agence canadienne d'inspection des aliments , 2021. Lymantria dispar dispar (LDD) – Fiche de renseignements.

Canadian Council on Invasive Species
Conseil Canadien des Espèces Envahissantes
Agence canadienne d'inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency